

SIDUMID JA SEOSED

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

1

Kahe hulga positsioneerimatus paaris

- Vaatleme kaht hulka H_1 ning H_2 ja neist koosnevaid paare $\{H_1, H_2\}$ ning $\{H_2, H_1\}$.
- Kuna mõlemad paarid koosnevad samadest elementidest, siis ekstensionaalsuse aksioomi põhjal peab kehtima võrdus $\{H_1, H_2\} = \{H_2, H_1\}$.
- Seetõttu võime öelda, et paaris pole **põhimõtteliselt** selge, kumb element on esimene ja kumb on teine

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

2

Kahe hulga positsioneerimatus paaris

- **Probleem:** Mida tähendab **on esimene** või **on teine**
- **Probleem:** Milline peaks olema **niisugune konstruktsioon** uue hulga G' moodustamiseks, mis
(1) on moodustatud kahest hulgast H'_1 ja H'_2 lähtudes, kusjuures
(2) **kui seda sama konstruktsiooni** kasutades moodustada veel mõni uus hulk G'' kahest hulgast H''_1 ja H''_2 lähtudes,
siis võrdus $G' = G''$ saab kehtida ainult juhul, kui $H'_1 = H''_1$ ja samas $H'_2 = H''_2$.

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

3

Järjestatud paari moodustamine

- Vaatleme kaht hulka H_1 ning H_2 ja neist moodustatud uut hulka G , mille korral kehtib võrdus $G = \{ \{H_1\}, \{H_1, H_2\} \}$

Teoreem. Kui mingite hulkade H'_1 ja H'_2 korral $G' = \{ \{H'_1\}, \{H'_1, H'_2\} \}$ ja mingite hulkade H''_1 ja H''_2 korral $G'' = \{ \{H''_1\}, \{H''_1, H''_2\} \}$, siis võrdus $G' = G''$ kehtib ainult juhul, kui kehtivad võrdused $H'_1 = H''_1$ ja $H'_2 = H''_2$.

Märkus. Äsjaesitatud teoreemi alusel võime eelsõnastatud probleemi lahendada järgmise **moodustamise viisi** abil: $\{ \{ \}, \{ \}, \{ \} \}$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

4

Järjestatud paarid

Määratlus. (Kuratowski 1921) Hulkadest H_1 ning H_2 moodustatud uut hulka G , mille korral kehtib võrdus $G = \{ \{H_1\}, \{H_1, H_2\} \}$ nimetame hulkadest H_1 ja H_2 moodustatud **järjestatud paariks** ning tähistame kirjutisega $\langle H_1, H_2 \rangle$.

Seejuures nimetame hulka H_1 järjestatud paari $\langle H_1, H_2 \rangle$ **esimeseks elemendiks** ja hulka H_2 järjestatud paari $\langle H_1, H_2 \rangle$ **teiseks elemendiks**.

Järeldus. Võrdus $\langle H'_1, H'_2 \rangle = \langle H''_1, H''_2 \rangle$ kehtib parajasti siis, kui kehtivad võrdused $H'_1 = H''_1$ ja $H'_2 = H''_2$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

5

Suvalise pikkusega sidumid ehk korteežid

Määratlus. Hulkadest $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n, H_{n+1}$ moodustatud sidumiteks ehk korteežideks nimetame järgmisi hulki:

- Järjestatud paari $\langle H_1, H_2 \rangle$ nimetame hulkadest H_1 ning H_2 moodustatud **kahekohaliseks sidumiks ehk korteežiks**, mille **esimeseks elemendiks** nimetame hulka H_1 ja **teiseks elemendiks** nimetame hulka H_2
- Olgu $\langle H_1, H_2, H_3, \dots, H_n \rangle$ n -kohaline sidum. Järjestatud paari $\langle \langle H_1, H_2, H_3, \dots, H_n \rangle, H_{n+1} \rangle$ nimetame hulkadest H_1, \dots, H_{n+1} moodustatud **$n+1$ -kohaliseks sidumiks ehk korteežiks** ja tähistame kirjutisega $\langle H_1, H_2, H_3, \dots, H_n, H_{n+1} \rangle$, mille **esimeseks elemendiks** nimetame hulka H_1 ja **teiseks elemendiks** nimetame hulka $H_2 \dots \dots$ ja **$n+1$ -ks elemendiks** nimetame hulka H_{n+1}

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

6

Sidumite ehk korteežide võrdlemine

Korteežide ehk sidumite põhiteoreem.

Kaks korteeži on võrdsed parajasti siis kui nad on ühe ja sama kohalisusega (näiteks mõlemad on kolmekohalised) ja kui samadel (ehk täpsemalt sama numbriga) kohtadel figureerivad samad hulgad.

Ehk teiste sõnadega: Võrdus

$\langle A_1, A_2, A_3, \dots, A_n \rangle = \langle B_1, B_2, B_3, \dots, B_m \rangle$ kehtib parajasti siis, kui kehtivad võrdused $n = m$ ning

$$A_1 = B_1, A_2 = B_2, A_3 = B_3, \dots, A_n = B_m$$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

7

Naturaalarvudest moodustatud järjestatud paarid

$\langle 0,0 \rangle \langle 0,1 \rangle \langle 0,2 \rangle \langle 0,3 \rangle \langle 0,4 \rangle \langle 0,5 \rangle \langle 0,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 1,0 \rangle \langle 1,1 \rangle \langle 1,2 \rangle \langle 1,3 \rangle \langle 1,4 \rangle \langle 1,5 \rangle \langle 1,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 2,0 \rangle \langle 2,1 \rangle \langle 2,2 \rangle \langle 2,3 \rangle \langle 2,4 \rangle \langle 2,5 \rangle \langle 2,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 3,0 \rangle \langle 3,1 \rangle \langle 3,2 \rangle \langle 3,3 \rangle \langle 3,4 \rangle \langle 3,5 \rangle \langle 3,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 4,0 \rangle \langle 4,1 \rangle \langle 4,2 \rangle \langle 4,3 \rangle \langle 4,4 \rangle \langle 4,5 \rangle \langle 4,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 5,0 \rangle \langle 5,1 \rangle \langle 5,2 \rangle \langle 5,3 \rangle \langle 5,4 \rangle \langle 5,5 \rangle \langle 5,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 6,0 \rangle \langle 6,1 \rangle \langle 6,2 \rangle \langle 6,3 \rangle \langle 6,4 \rangle \langle 6,5 \rangle \langle 6,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$
 $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

Probleem: Leida ülalesitatud tabelis igale paarile $\langle x,y \rangle$ seda iseloomustav number n nõnda, et teades numbri n väärtust, saame teada ka vastavate x ja y väärtused.

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

8

Naturaalarvudest moodustatud järjestatud paaride Cantori numeratsioon

$\langle 0,0 \rangle \langle 0,1 \rangle \langle 0,2 \rangle \langle 0,3 \rangle \langle 0,4 \rangle \langle 0,5 \rangle \langle 0,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 1,0 \rangle \langle 1,1 \rangle \langle 1,2 \rangle \langle 1,3 \rangle \langle 1,4 \rangle \langle 1,5 \rangle \langle 1,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 2,0 \rangle \langle 2,1 \rangle \langle 2,2 \rangle \langle 2,3 \rangle \langle 2,4 \rangle \langle 2,5 \rangle \langle 2,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 3,0 \rangle \langle 3,1 \rangle \langle 3,2 \rangle \langle 3,3 \rangle \langle 3,4 \rangle \langle 3,5 \rangle \langle 3,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 4,0 \rangle \langle 4,1 \rangle \langle 4,2 \rangle \langle 4,3 \rangle \langle 4,4 \rangle \langle 4,5 \rangle \langle 4,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 5,0 \rangle \langle 5,1 \rangle \langle 5,2 \rangle \langle 5,3 \rangle \langle 5,4 \rangle \langle 5,5 \rangle \langle 5,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\langle 6,0 \rangle \langle 6,1 \rangle \langle 6,2 \rangle \langle 6,3 \rangle \langle 6,4 \rangle \langle 6,5 \rangle \langle 6,6 \rangle \dots \dots \dots$
 $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$
 $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

Paari $\langle x,y \rangle$ Cantori number $c(x,y) = x + (x+y)(x+y+1)/2$


21/10/2013

(C) Peeter Lorents

9

Georg Cantor

Georg Ferdinand Ludwig
Philipp Cantor
3.märts, 1845
Saint Petersburg, Venemaa
–
6.jaanuar, 1918 (vanuses 72)
Halle, Province of Saxony,
German Empire



21/10/2013

(C) Peeter Lorents

10

Cantori funktsioonid

Määratlus. Cantori funktsioonideks, mille tähisteks on kirjutised c^m ja c_{mj} , kus $m \geq 2$ ning $m \geq j \geq 1$, nimetame funktsioone, mille korral on täidetud järgmised tingimused:

$$c^2(x,y) = c(x,y) = x + (x+y)(x+y+1)/2$$

$c_{21}(n) = n - w(w+1)/2$ ja $c_{22}(n) = w - c_{21}(n)$, kus w on esimene niisugune arv, mille korral kehtivad võrratused

$$w(w+1)/2 \leq n < (w+1)(w+2)/2$$

$$c^{m+1}(x,y, \dots, z,u) = c(c^m(x,y, \dots, z), u)$$

$$c_{m+1m+1}(n) = c_{22}(n), c_{m+1m}(n) = c_{22}(c_{21}(n)), \dots$$

$$c_{m+12}(n) = c_{22}(c_{21}(\dots(c_{21}(n)\dots))), c_{m+11}(n) = c_{21}(c_{21}(\dots(c_{21}(n)\dots)))$$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

11

Cantori funktsioonide omadusi

• Kui $c^2(x,y) = n$, siis $c_{21}(n) = x$ ja $c_{22}(n) = y$

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $c_{21}(n)$ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $c_{22}(n)$ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

$$c^2(c_{21}(n), c_{22}(n)) = n$$

$$c_{21}(c^2(x,y)) = x$$

$$c_{22}(c^2(x,y)) = y$$

Kui $c^3(x,y,z) = m$, siis $c_{31}(m) = x$, $c_{32}(m) = y$, $c_{33}(m) = z$

$$c^3(c_{31}(m), c_{32}(m), c_{33}(m)) = m$$

$$c_{31}(c^3(x,y,z)) = x$$

$$c_{32}(c^3(x,y,z)) = y$$

$$c_{33}(c^3(x,y,z)) = z$$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

12

Cartesiusse korrutised

Määratlus. Hulkade A ja B *Cartesiusse korrutiseks* nimetame hulka $\{ \langle \alpha, \beta \rangle \mid (\alpha \in A) \& (\beta \in B) \}$,

mida tähistame kirjutisega $A \times B$.

Seega $A \times B = \{ \langle \alpha, \beta \rangle \mid (\alpha \in A) \& (\beta \in B) \}$

Näide 1. Kui $A = \{1, 2\}$ ja $B = \{x, y, z\}$, siis

$A \times B = \{ \langle 1, x \rangle, \langle 1, y \rangle, \langle 1, z \rangle, \langle 2, x \rangle, \langle 2, y \rangle, \langle 2, z \rangle \}$

$B \times A = \{ \langle x, 1 \rangle, \langle x, 2 \rangle, \langle y, 1 \rangle, \langle y, 2 \rangle, \langle z, 1 \rangle, \langle z, 2 \rangle \}$

Järeldus. Üldjuhul $A \times B \neq B \times A$

Määratlus (järg). $A \times \dots \times B \times C = (A \times \dots \times B) \times C$



René Descartes
(1596 – 1650)

Teoreem. Kui hulgad A, \dots, B, C on lõplikud, siis

$E(A \times \dots \times B \times C) = E(A) \cdot \dots \cdot E(B) \cdot E(C)$.

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

13

Cartesiusse astmed

Määratlus. Hulga A *Cartesiusse astmed*

$A^{(0)} = 1 = \{ \emptyset \}$, $A^{(1)} = A$, $A^{(n+1)} = A^{(n)} \times A$

Näited. Kui $H = \{0, 1\}$, siis

$H^{(1)} = H$

$H^{(2)} = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$,

$H^{(3)} = \{ \langle 0, 0, 0 \rangle, \langle 0, 0, 1 \rangle, \langle 0, 1, 0 \rangle, \langle 0, 1, 1 \rangle, \langle 1, 0, 0 \rangle, \langle 1, 0, 1 \rangle, \langle 1, 1, 0 \rangle, \langle 1, 1, 1 \rangle \}$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

14

Predikaatide määratlus I

• Ühekohaliseks predikaadiks hulgas H ehk hulga H elementide omaduseks nimetame hulga H suvalist osahulka Ω . Kui Ω tähistab hulga H elementide mingit omadust ja α tähistab hulga H mingit elementi, siis

• $\Omega(\alpha)$ elemendil α on omadus Ω

• elemendil α on omadus Ω $\int \alpha \in \Omega$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

15

Omaduste näited I

- Vaatleme hulka $\{\triangle, \diamond, \circ, \star, 0\}$ ning omadust ∇ , mille korral $\nabla(\alpha)$ element α on nurgeline.
Sellisel juhul $\nabla = \{\triangle, \diamond, \star\}$
- Vaatleme hulka $\{\triangle, \diamond, \circ, \star, 0\}$ ning omadust Ω , mille korral $\Omega(\beta)$ element β on ümar.
Sellisel juhul $\Omega = \{\circ, 0\}$
- Vaatleme hulka $\{\triangle, \diamond, \circ, \star, 0\}$ ning omadust K , mille korral $K(\gamma)$ element γ on isekülgne.
Sellisel juhul $K = \emptyset$
- Vaatleme hulka $\{\triangle, \diamond, \circ, \star, 0\}$ ning omadust M , mille korral $M(\varepsilon)$ element ε on mõõtuv.
Sellisel juhul $M = \{\triangle, \diamond, \circ, \star, 0\}$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

16

Omaduste näited II

- Vaatleme hulka $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ning omadust P , mille korral $P(m)$ element m on paarisarv.
Sellisel juhul $P = \{2, 4, 6\}$
- Vaatleme hulka $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ning omadust T , mille korral $T(u)$ element u on täisruut.
Sellisel juhul $T = \{1, 4\}$
- Vaatleme hulka $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ning omadust Q , mille korral $Q(t)$ element t on kuuekohaline.
Sellisel juhul $Q = \emptyset$
- Vaatleme hulka $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ning omadust Pos , mille korral $Pos(e)$ element e on positiivne.
Sellisel juhul $Pos = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

17

Predikaatide määratlus II

- **k+1-kohaliseks predikaadiks** ehk **k+1-kohaliseks seoseks hulkade** $H_1, H_2, \dots, H_k, H_{k+1}$ elementide vahel nimetame hulga $H_1 \times H_2 \times \dots \times H_k \times H_{k+1}$ suvalist osahulka
Kui Φ tähistab mingit seost $H_1, H_2, \dots, H_k, H_{k+1}$ elementide vahel ja $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$ tähistavad mingeid elemente vastavatest hulkadest, siis
- $\Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1})$ element $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$ on seoses Φ
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$ on seoses Φ $\int [(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}) \in \Phi]$
& $[\Phi \subseteq H_1 \times H_2 \times \dots \times H_k \times H_{k+1}]$

Teoreem. Mistahes m-kohaline seos on olemuselt m-kohaliste predikaatide omadus.

Tõestus. Tuleneb seose ja omaduse definitsioonist.

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

18

Funktsionaalsed seosed

Määratlus. Mingit $k+2$ -kohalist seost F nimetatakse $k+2$ -kohaliseks funktsionaalseks seoseks ehk (NB!) $k+1$ -kohaliseks funktsiooniks, kui selle seose kõikide sidumite viimased elemendid on eelnevate poolt üheselt määratud ehk lühemalt: kui $\langle x_1, \dots, x_{k+1}, y' \rangle \in F$ ning $\langle x_1, \dots, x_{k+1}, y'' \rangle \in F$, siis $y' = y''$.

Kokkuleppeliselt kasutatakse järgmist tähistusviisi:

$$F(x_1, \dots, x_{k+1}) = y \iff \langle x_1, \dots, x_{k+1}, y \rangle \in F$$

$$F(x_1, \dots, x_{k+1}) \iff (\exists y) [F(x_1, \dots, x_{k+1}) = y \ \& \ \langle x_1, \dots, x_{k+1}, y \rangle \in F]$$

Kokkulepe. Kahekohalise funktsiooni sümbol kirjutatakse sageli "vahele", mitte ette. Näiteks $m+n$, mitte aga $+(m,n)$.

Samas aga kirjutatakse reeglina $\max(\alpha, \beta)$, mitte aga $\alpha \max \beta$.

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

19

Funktsioonide näiteid

- Kahekohaline seos F , mille korral $F(x)=t \int x$ isa on t **on** ühekohaline funktsioon
- Kolmekohaline seos P , mille korral $P(x,y)=c \int x$ ja y on c vanemateks **ei ole** kahekohaline funktsioon
- Kolmekohaline seos d , mille korral $d(u,w)=r \int u$ ja w vaheline kaugus on r **on** kahekohaline funktsioon
- Neljakohaline seos Ekvid, mille korral $\text{Ekvid}(m,n,p,q) \int |m-n|=|p-q|$ **ei ole** kolmekohaline funktsioon

21/10/2013

(C) Peeter Lorents

20
